

Gegenüberstellung der revidierten 2025 ASAS-SPARTAN Klassifikationskriterien für die axiale Spondyloarthritis und der 2009 ASAS-Klassifikationskriterien – eine Analyse aus dem RABBIT-SpA Register

Anja Weiß¹, Denis Poddubnyy², Uta Kiltz^{3,4}, David Simon⁵, Frank Behrens^{6,7}, Xenofon Baraliakos^{3,4}, Martin Rudwaleit⁸, Anne C. Regierer¹

¹Deutsches Rheuma-Forschungszentrum (DRFZ), Epidemiologie und Versorgungsforschung, Register-Forschung in der Rheumatologie, Berlin, ²University of Toronto, Division of Rheumatology, Toronto, Canada, ³Ruhr Universität, Bochum, ⁴Rheumazentrum Ruhrgebiet, Herne, ⁵Charité – Universitätsmedizin Berlin, Berlin, ⁶Universitätsklinikum Frankfurt, Rheumatologie, Frankfurt, ⁷Fraunhofer Institut ITMP, Frankfurt, ⁸Universitätsklinikum Bielefeld, Bielefeld


Ziel

Vergleich der

- ASAS Klassifikationskriterien für axSpA von 2009 und
- der 2025 neu vorgeschlagenen ASAS-SPARTAN Klassifikationskriterien

Methodik

- alle axSpA Patient:innen aus dem RABBIT-SpA Register
- axSpA Diagnose durch Rheumatolog:in
- Alle Parameter aus beiden Sets können abgebildet werden



Ergebnisse

2009 \ 2025	2009		
	erfüllt	nicht erfüllt	
erfüllt	1.507 (67%)	0	1.507 (67%)
nicht erfüllt	191 (9%)	538 (24%)	729 (33%)
	1.698 (76%)	538 (24%)	2.236

Baseline Parameter für alle axSpA Patient:innen zum Einschluss in RABBIT-SpA

Baseline Parameter	N = 2.236
Frauen	44%
Alter, MW	44.2
BMI >30	25%
≥3 Komorbiditäten	19%
Symptombdauer in Jahren, MW	11.7
Diagnosedauer in Jahren, MW	6.6
ASDAS, MW	2.8
BASDAI, MW	4.7
BASFI, MW	3.7
PhGA, MW	5.2
PtGA, MW	5.8

SpA Features für alle axSpA Patient:innen zum Einschluss in RABBIT-SpA

SpA Features	2.236 (100%)
HLA-B27	1.596 (71%)
ERS	2.084 (93%)
Arthritis	1.070 (48%)
Enthesitis	518 (23%)
Uveitis	360 (16%)
Psoriasis	284 (13%)
CED	133 (6%)
Erhöhtes CRP	1.349 (60%)
Daktylitis	90 (4%)
NSAR Ansprechen	1.506 (67%)
Familienanamnese für SpA	636 (28%)